



### GP 12

Die überwinterten Grünpflanzen bringen am schnellsten einen Vollertrag. Es handelt sich hierbei um mikrovermehrte, virusfreie Pflanzen, die im Gewächshaus pikiert, anschliessend im Freien abgehärtet und im Kühler überwintert wurden. In jeder Kulturplatte befinden sich 60 Pflanzen. Der beste Pflanztermin ist im April. Bei optimalen Bedingungen können die Pflanzen schon im Pflanzjahr 3 bis 5 Ruten bilden und eine Länge von 2 m erreichen. Bereits im Jahr nach der Pflanzung wird annähernd ein Vollertrag erreicht.



### GP 37

Im Pflanzjahr vermehrte, virusfreie Grünpflanzen. Die Pflanzen werden in 60er-Kulturplatten herangezogen und vor der Auslieferung schrittweise abgehärtet. Sie haben eine Höhe von ca. 10–15 cm. Die Pflanzung sollte von Ende August bis Ende September erfolgen. Danach besteht die Gefahr von Winterschäden. Im geschützten Anbau ist auch eine spätere Pflanzung möglich.



### Long Canes

Bei Brombeeren kann man durch Einsatz von sogenannten «Long Canes» den Erntezeitraum ähnlich terminieren wie bei Erdbeeren.

Im Vorjahr werden Long Canes in 3.5–4.5 l Töpfen kultiviert. Pro Topf werden in der Regel 4 Ruten auf eine Höhe von 1.60m bis 1.80m herangezogen. Im Winter werden diese Pflanzen eingelagert und bei  $-1.5^{\circ}\text{C}$  gekühlt. Im Folgejahr können sie zu dem gewünschten Zeitpunkt aus dem Kühler genommen und gepflanzt werden. Je nach Pflanztermin beginnt die Ernte 70 bis 90 Tage nach der Pflanzung.

### Verfügbare Sorten:

LOCH TAY (s)

LOCH NESS

ASTERINA® fruloche (s)

SWEET ROYALLA®

